

Acer nipponicum

synonyma: *Acer brevilobum*, *Acer crassipes*, *A. subsp. orientale*, *A. var. australe*, *A. var. koshinense*, *A. var. orientale*, *Acer parviflorum*, *Acer pensylvanicum subsp. parviflorum*, *Acer pictum var. parviflorum*, *Acer spicatum var. ukurunduense*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Japonsko

Pochází z vyšších poloh Japonska. Patří mezi opadavé stromy. Dorůstá výšky 15 - 20m, v kultuře obvykle 10 - 12m. Borka je hladká a šedá nebo zelenošedá. Mladé větve jsou tmavězelené, v mládí jemně hnědě plstnaté. Listy jsou obvykle 5tilaločné, hluboce srdčité, laloky jsou široce vejčité, bledězelené, centrální lalok mnohem větší, dolní strana rezavě ochlupená, podzimní barva je žlutohnědá až žlutá, řapíky jsou dlouhé 8 - 15cm a celková délka i šířka je 12 - 25cm. Kveté v hustých klasech o délce 10 - 40cm zelenožlutými květy. Někteří jedinci kvetou pouze samčími květy. Křídla 2nažek jsou dlouhá 3 - 5cm a svírají ostrý úhel.

<https://www.rostliny.net/>