

Acer oblongum

synonyma: Acer albopurpurascens, Acer buergerianum subsp. formosanum, Acer buergerianum var. formosanum, Acer buzimpala, Acer discolor, Acer hypoleucum, Acer itoanum, Acer laikuani, Acer lanceolatum, Acer laurifolium, Acer litseifolium, Acer nepalense, Acer nepalense var. oblongifolium, Acer oblongifolium, A. f. concolor, A. f. glaucum, A. f. microcarpum, A. var. concolor, A. var. itoanum, A. var. laosianum, A. var. latialatum, A. var. membranaceum, A. var. microcarpum, A. var. pachyphyllum, Acer paxii var. integrifolium, Acer trifidum var. formosanum, Acer trifidum var. integrifolium, Euacer laevifolium

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Hubei, Japonsko, Jiangxi, JZ Čína, Nepál, Pákistán, S Indie, Sichuan, Sikkim, Z Himálaj

Roste ve vyšších polohách Asie v západním Himálaji, Nepálu, Kašmíru, Pakistánu a v Číně v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky (6 -) 15 - 20 (i 22)m. Borka je šedá. Mladé větve jsou ochlupené a zbarvené do červenobronzova. Vstřícné listy jsou kožovité, mírně kopinaté, špičaté, v mládí občas 3laločné, svěže zelené, dlouhé 5 - 12 (i 18)cm, široké (2 -) 4 - 6 (i 8)cm a spodní strana je sedozelená, holá, žilnatinu tvoří 6 - 8 páru žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4cm. Kvete oboupohlavnými žlutozelenými až zelenobílými 4mm květy o průměru 7 - 9mm v 3 - 7cm širokých latách, kališní lístky jsou podlouhlé až čárkovité, široké 1 - 2mm, korunní lístky jsou obvejčité až kopinaté a široké 1 - 2mm, tyčinek je 8 a semeníky jsou ochlupené. Nažky jsou dlouhé 2 - 5cm, široké 8mm a křídla svírají pravý úhel. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. concolor - Sichuan; horní strana listu leštělá, modrozelená, spodní bledězelená, lesklá
- var. itoanum - Okinawa; listy menší, okraj mírně zvlněný
- var. latialatum - Hubei; listy celistvé celokrajné; křídla 2nažek dlouhá 3m, uprostřed široká 1 - 2cm
- var. membranaceum - blanité listy
- var. microcarpum - malé plody
- var. oblongum/var. omeiense/A. pehpeiense/A. wuyishanicum - Indie, Nepál, Sikkim; úzká 8mm široká křídla nažek
- var. pachyphyllum - Jiangxi; listy kožovité, celistvé, celokrajné; křídla nažek dlouhá 2cm
- var. trilobum - západní Hubei; listy 3laločné, okraj pilovitý; křídla plodů široká 8mm