

# Acer oblongum

synonyma: *Acer albopurpurascens*, *Acer buergerianum* subsp. *formosanum*, *Acer buergerianum* var. *formosanum*, *Acer buzimpala*, *Acer discolor*, *Acer hypoleucum*, *Acer itoanum*, *Acer laikuunii*, *Acer lanceolatum*, *Acer laurifolium*, *Acer litseifolium*, *Acer nepalense*, *Acer nepalense* var. *oblongifolium*, *Acer oblongifolium*, *A. f. concolor*, *A. f. glaucum*, *A. f. microcarpum*, *A. var. concolor*, *A. var. itoanum*, *A. var. laosianum*, *A. var. latialatum*, *A. var. membranaceum*, *A. var. microcarpum*, *A. var. pachyphyllum*, *Acer paxii* var. *integrifolium*, *Acer trifidum* var. *formosanum*, *Acer trifidum* var. *integrifolium*, *Euacer laevifolium*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Hubei, Japonsko, Jiangxi, JZ Čína, Nepál, Pákistán, S Indie, Sichuan, Sikkim, Z Himálaj

Roste ve vyšších polohách Asie v západním Himálaji, Nepálu, Kašmíru, Pákistánu a v Číně v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky (6 -) 15 - 20 (i 22)m. Borka je šedá. Mladé větve jsou ochlupené a zbarvené do červenobronzova. Vstříčné listy jsou kožovité, mírně kopinaté, špičaté, v mládí občas 3laločné, svěže zelené, dlouhé 5 - 12 (i 18)cm, široké (2 -) 4 - 6 (i 8)cm a spodní strana je šedozelená, holá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4cm. Kvete oboupohlavnými žlutozelenými až zelenobílými 4mm květy o průměru 7 - 9mm v 3 - 7cm širokých latách, kališní lístky jsou podlouhlé až čárkovité, široké 1 - 2mm, korunní lístky jsou obvejčité až kopinaté a široké 1 - 2mm, tyčinek je 8 a semeníky jsou ochlupené. Nažky jsou dlouhé 2 - 5cm, široké 8mm a křídla svírají pravý úhel. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *concolor* - Sichuan; horní strana listu lesklá, modrozelená, spodní bledězelená, lesklá
- var. *itoanum* - Okinawa; listy menší, okraj mírně zvlňný
- var. *latialatum* - Hubei; listy celistvé celokrajné; křídla 2nažek dlouhá 3m, uprostřed široká 1 - 2cm
- var. *membranaceum* - blanité listy
- var. *microcarpum* - malé plody
- var. *oblongum*/var. *omeiense*/A. *pehpeiense*/A. *wuyishanicum* - Indie, Nepál, Sikkim; úzká 8mm široká křídla nažek
- var. *pachyphyllum* - Jiangxi; listy kožovité, celistvé, celokrajné; křídla nažek dlouhá 2cm
- var. *trilobum* - západní Hubei; listy 3laločné, okraj pilovitý; křídla plodů široká 8mm

<https://www.rostliny.net/>