

Acer oliverianum (Javor Oliverův)

čeleď: Sapindaceae

oblasti: J Čína, Střední Čína, Tchaj-wan

Roste v Číně. Patří mezi širokolisté opadavé javory. Dorůstá výšky až 10 (i 20)m, ale obvyklá je spíše v rozmezí 5 - 8m. Borka je hladká, nazelenalá, bíle pruhovaná. Mladé větve jsou holé nebo řídce ochlupené, v mládí zelené až růžovofialové. Vstřícné listy mají srdčitou bázi, délku 4 - 10 (i 12)cm, šířku 5 - 9cm a 5 dlanitých vejčitých laloků se špičkou, báze je uťatá až téměř srdčitá, laloky jsou 3úhle vejčité, špičaté, jemně pilovité, na obou stranách svěžezelené, holé, lesklé, na spodní straně síťnaté, řapíky jsou dlouhé 2,5 - 5cm. Kvete bělavými nebo narůžovělými 5tičetnými květy v 4 - 10cm dlouhých chocholících. Kališních lístků je 5, délky 3 - 4mm, okvětních lístků je 5 a mají vejčitý tvar délky 3 - 4mm. Plodem je nažka s křídélkem délky 2,5cm, pouzdra semen jsou holá, dlouhá 6mm a široká 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. formosanum/f. longistaminum/f. microcarpum/subvar. formosanum/var. microcarpum/var. nakaharae/var. nakaharai/A. serrulatum - Tchaj-wan, Čína; opadavý strom; výška do 20m; mladé větve načervenalé, holé; listy dlouhé 7cm, široké 8 - 10cm, z obou stran holé, báze je srdčitá, žilnatinu tvoří 5 párů žilek, čepel 5tilaločná, laloky 3úhle kopinaté, centrální lalok dlouhý 5 - 7cm, okraj nepravidelně nebo hrubě 2x vroubkovaně pilovitý, podzimní barva žlutá, řapíky holé, dlouhé 1,5 - 3cm; květy žluté, mají 5 okvětní lístků; nažky jsou dlouhé 2,5cm, křídla svírají úhel 90 - 120°
- subsp. oliverianum/A. campbellii subsp. oliverianum - laloky listů 3úhle vejčité; nažky dlouhé 3 - 3,5cm, křídla nažek vodorovně odstávají

<https://www.rostliny.net/>