

Acer opalus (Javor kalinolistý)

synonyma: *Acer apolifolium*, *Acer hispanicum*, *Acer hispanicum* f. *montsiccianum*, *Acer italicum*, *Acer italum*, *Acer italum* f. *opulifolium*, *Acer italum* subsp. *hispanicum*, *Acer italum* subsp. *variabile*, *Acer italum* var. *crassifolium*, *Acer italum* var. *hispanicum*, *Acer italum* var. *opulifolium*, *Acer italum* var. *variabile*, *Acer leptopterum*, *Acer montanum*, A. f. *glaucum*, A. f. *microphyllum*, A. f. *pubescens*, A. subsp. *africanum*, A. subsp. *hispanicum*, A. var. *africanum*, A. var. *brachypterum*, A. var. *macropterum*, A. var. *microcarpum*, A. var. *montsiccianum*, A. var. *stenopterum*, *Acer opulifolium*, *Acer opulifolium* var. *opalus*, *Acer opulifolius*, *Acer pseudoplatanus* var. *opulifolium*, *Acer rotundifolium*, *Acer rupicolum*, *Acer vernum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Bosna a Hercegovina, Dalmácie, Francie, Itálie, Katalánsko, Kréta, Maroko, Německo, Rumunsko, Srbsko, Švýcarsko

Pochází z lesů jihozápadní Evropy. Patří mezi opadavé rostliny. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)m a šířky 15m v široce sloupovitém hustém habitu. Borka má šedorůžovou barvu, na starých je rozpukaná, tmavá a odlupuje se v čtvercových plátech. Mladé větve jsou červenohnědé, holí. Tvar listu je variabilní. Počet laloků se pohybuje od 3 - 5, jejich chloubka není velká a centrální lalok je znovu 3laločný. Mají lesklou tmavězelenou barvu, spodní stranu mírně ochlupenou, modrozelenou, délku do 10cm, šířku 5 - 15cm, řapíky jsou dlouhé 4 - 9cm a na podzim přecházejí do žluté barvy. Kvete žlutými květy v převislých chocholících. Květ má 2 - 4cm stopku. Nažky mají délku 2,5 - 4 (i 5)cm a křídla jsou vynikle žilnatá a svírají pravý úhel. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *corallinum* - červené nažky

- subsp. *hispanicum*/var. *africanum*/A. *cadevalii*/A. *hispanicum*/A. *granatense*/A. *nevadense* - Španělsko, Francie; malý keř nebo keřovitý stromek, hustěji větvený; výška 6 - 8m; borka šedohnědá; listy malé, 5tialočné, dlouhé (1 -) 2,5 - 7,5 (i 11)cm, na spodní straně podél žilek ochlupené, laloky tupé; kvete v chocholících žlutými květy, mají 5 kališních lístků délky 3 - 4mm a 5 korunních lístků délky 3 - 5mm; nažka jsou malé

- var. *microphyllum*/A. *microphyllum* - široce stormkovitý kompaktní keř s více kmínky, koruna rozložitá; borka téměř černá; větve krátké; listy téměř okrouhlé, široké 3cm, 5tilaločné, na horní straně tmavězelené, spodní bledší, laloky mívají 3 krátké zuby

- subsp. *obtusatum*/var. *bosniacum*/var. *obtusatum*/A. *italicum* var. *aetnense*/A. *italum* var. *neapolitanum*/A. *obtusatum*/A. *opulifolium* var. *velutinum*/A. *opulifolius obtusatum* - Kréta, Dalmácie, Bosna, Srbsko, Rumunsko - malé stromy nebo keře větvené již od báze, široce vejčité, výška do 8m; listy na horní straně holé, na spodní šedozelené, měkce ochlupené, báze bývá srdčitá, až 7 krátkých laloků, laloky nejsou nikdy špičaté, řídce zubaté, celková šířka až 10cm; nažky mají 3cm křídla

- var. *tomentosum*/var. *neapolitanum*/A. *neapolitanum* - Itálie; listy široké až 16cm, laloky krátké, okrouhlé, na spodní straně ochlupené, okraje nevýrazně vroubkovaně pilovité

<https://www.rostliny.net/>