

Acer pensylvanicum (Javor pensylvánský)

synonyma: *Acer canadense*, *A. var. integrifolium*, *Acer striatum*, *Acer tricuspidatum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Connecticut, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky. Patří mezi opadavé stromy a řadí se do skupiny tzv. pyžamových javorů s pruhovanou borkou. Dorůstá výšky 5 - 10m při průměru kmene do 20cm a šířky až 8m v široce sloupovitém habitu. Borka je nazelenalá, svisle zeleně a bíle pruhovaná. Větve jsou hladké, nahoře olivové až hnědé, pupeny 2šupinné, tmavě červené až žlutohnědé. Okrouhlé listy délky 8 - 18 (i 22)cm, šířky 6 - 12 (i 21)cm mají na konci 3 ostře 2x pilové špičaté laloky. Spodní strana je světlejší a hnědočerveně až rezavě ochlupená. Na podzim se barví do žluta. Kvete světlezelenými květy v až 12cm květenství. Plodem je okřídlená 2 - 2,5cm 2nažka. Křídélka svírají úhel 145°. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albo-variegatum' - vzpřímený až stromkový keř; koruna protáhle vejčitá až válcovitá, zaoblená; listy bíle pestré
- 'Aureo-marginatum' - žlutopestré listy
- 'Erythrocladum'/f. *erythrocladum*/*A. rufinerve* 'Erythrocladum' - výška 5 - 6m; růst do šířky; mladé větve v zimě růžové nebo červenorůžové, bíle pruhované, v létě zelenobílé nebo nažloutlé; žlutozelené 3laločné listy, světlezelené, na podzim žluté; pomalý růst

<https://www.rostliny.net/>