

Acer rufinerve (Javor rezavožilný)

synonyma: *Acer cucullobracteatum*, *Acer pensylvanicum* subsp. *rufinerve*, *A. f. albolimbato*, *A. f. angustifolium*, *A. f. marmoratum*, *A. var. albolimbato*, *A. var. marginatum*, *A. var. marmoratum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Japonsko

Pochází z Japonska. Patří mezi malé opadavé stromy a řadí se do skupiny tzv. pyžamových javorů s pruhovanou borkou. Dorůstá výšky až 8 - 10 (i 15)m při průměru kmene do 40cm a šířky až 8m v široce sloupovitém habitu. Borka je nazelenalá, bíle nebo zelinkavě pruhovaná, v mladí hladká, později hrubá. Pupeny s výhony mají modře ojněný povrch. Vstřícné listy délky 8 - 13 (i 16)cm, šířky 6 - 16cm, mají tmavězelenou barvu, na spodní straně má rezavě ochlupenou žilnatinu a je světlejší, je mělce 3 (výjimečně i 5)x laločnatý a řapíky jsou dlouhé 2 - 7cm. Podzimní barva je ostře oranžová. Kvete žlutozelenými kvítky v 10cm vzprámených hroznech. Plodem je 2 - 3cm nažka se 2mi zelenočervenými křídly. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albolimbato'/'Albo-limbato'/'Furi Turihaka

Kaede'/'Hatsuyuki'/'Marginatum'/'Marmoratum'/'Shufu Nishiki'/'Uriha Nishiki'/'Whitedot'/'f.

albolimbato/'A. japonicum 'Argenteum' - velký keř nebo pomalu rostoucí mnohokmenný strom; větve obloukovité; borka méně nápadně pruhovaná; výška 10 - 12m; listy 3 - 5laločné, bazální laloky krátké, barva zelená nebo tmavězelená, bíle lemovaně křepinatá, zvrhává se do zelené, báze listu zaoblená až srdčitá, okraj mírně 2x pilovitý, celková délka 7 - 15cm a šířka 5 - 9cm

- 'Beni Uri'/'Kyo Nishiki' - listy 3 - 5laločné, laloky krátké, 3úhlé, pilovité, dlouhé 8 - 14cm, ne tolik 3úhlé, zelené, silně žlutopestré, občas i přes 1/2 délky, na podzim světlejší, na podzim červené nebo žluté; rychlý růst

- 'Erythrocladum' - žlutozelené listy

- 'Hatsuyaki' - panašované listy

- 'Luteo-variegatum' - listy žlutopestré

- 'Shirayuki' - listy nažlutlé

- 'Sunshine' - keřovitý strom; listy žluté s malými zelenými středy, během léta se zbarvují do zelenožluté

- 'Winter Gold' - mírně menší, v zimě s jasnou žlutou kůrou, v létě kůra spíše zelenožlutá; listy na podzim žluté až oranžové

<https://www.rostliny.net/>