

Acer spicatum (Javor klasnatý)

synonyma: *Acer dedyle*, *Acer montanum*, *Acer parviflorum*, *Acer pumilum*, *Acer rugosum*, *A. f. roseocarpum*, *A. f. rugosum*, *Acer striatum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě opadavé keře nebo nízké stromu s protáhle vejčitou až válcovitou zaoblenou korunou. Dorůstá výšky (3 -) 6 - 8 (i 12)m. Kmen je zakrslý. Mladé větve jsou červenohnědé, v mládí ochlupené. Vstříčné listy mají délku i šířku 6 - 10 (i 12)cm a je mělce 3 - 5ti laločnatý. Okraj je nepravidelně zubatý, báze srdčitá, barva žlutozelená, spodní v mládí ochlupená a řapíky jsou dlouhé 4 - 6cm. Podzimní barva listů je žlutá, oranžová nebo až červená. Kvete zelenavými drobnými květy v 8 - 15cm dlouhých vzpřímených hroznech. Okvětní lístky jsou dlouhé a úzké. Plodem je párová červená 2nažka délky 1,5 - 2,5 (i 3)cm, křídla svírají téměř pravý úhel a jsou na podzim červená.

Vyhovuje mu vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny.

<https://www.rostliny.net/>