

Acer tataricum (Javor tatarský)

synonyma: *Acer cordifolium*, *Acer tartaricum*, *Acer tartarinum*, *A. 'Cordifolium'*, *A. f. acutipterum*, *A. f. crispatum*, *A. f. crispum*, *A. f. cruciatum*, *A. f. incumbens*, *A. f. latialatum*, *A. f. nanum*, *A. f. oblongifolium*, *A. f. orbiculatum*, *A. f. platypterum*, *A. f. rotundifolium*, *A. f. rubrum*, *A. f. torminaloides*, *A. subsp. torminaloides*, *A. var. crispatum*, *A. var. hebecarpum*, *A. var. incumbens*, *A. var. slendzinskii*, *A. var. torminaloides*, *Euacer tataricum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Arménie, Bulharsko, Česká republika, Írán, JZ Rusko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Minnesota, Ohio, Rakousko, Rhode Island, Slovensko, Ukrajina, V Karpaty

Roste v lesích jihovýchodní Evropy a Turecka v podobě opadavého bohatě větveného keře nebo stromu s více kmeny. Dosahuje výšky i šířky (3 -) 4 - 10 (i 15)m při průměru kmene 20 - 50cm. Borka je šedohnědá a hladká. Větve jsou načervenalé nebo hnědé, v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné, široce oválné až vejčité, 3laločné, zelené, na podzim červené, 2x pilovité, dlouhé '4,5 -) 5 - 10cm, široké 3 - 7cm, báze je srdčitá, vzácně uťatá, při bázi max. 2 (i 4) laloky, které jsou pouze naznačené, řapíky jsou ochlupené a dlouhé 1,5 - 5cm. Kvete bílými nebo bledězelenými květy o průměru 3 - 5 (i 8)mm ve vzpřímených až 15cm latách. Plodem je načervenalá nebo nahnědlá až 3 - 4cm nažka s 2 - 3cm souběžným nebo i překrývajícím se křídlem. Pouzdro semena je může být ochlupené a žláznaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureo-variegatum' - tmavě žlutě skvrnité listy
- 'Cispatum'/'Crispum' - okraj listu zkadeřený
- 'Cuspidatum' - okraj listu zvlňžený
- f. *decalvens* - pouzdro semene je holé
- var. *incumbens* - Bulharsko; křídla nažek jsou proti sobě skloněná a celá se překrývají
- 'Nanum' - zakrnělý kompaktní keř
- f. *oblongifolium* - listy dlouze vejčité
- 'Patdell'/'Pattern Perfect' - kulovitý habitus; výška 6m, šířka 4 - 6m; kmínky červené; listy zelené, tlustší, na podzim oranžovočervené; plody červené, dlouho neopadávají
- f. *pubigerum* - pouzdro semene ochlupené
- f. *rotundifolium* - listy téměř okrouhlé
- 'Rubrum' - barva rašících listů je červená
- var. *slendzinskii* - listy bez laloků; křídla nažek svírají pravý úhel, nejsou ochlupené
- var. *torminaloides* - Arménie; listy 3laločné
- f. *typicum* - pouzdro semene holé
- 'Variegatum' - pestré listy

Vyhovuje mu teplé léto a suchá zima na plném slunci nebo v polostínu. Nemá specifické nároky na půdu.

<https://www.rostliny.net/>