

Acer tschonoskii (Javor Tschonoskův)

synonyma: *Acer australe*, *Acer pellucidobracteatum*, *A. f. macrophyllum*, *A. subsp. australe*, *A. var. australe*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Čína, Japonsko, Korea

Roste v Japonsku v podobě keře nebo nižšího stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou holé. Listy okrouhle vejčité až okrouhlé, 5 (i 7)laločné, laloky vejčité, ostře 2x pilovité, báze je srdčitá, podzimní barva žlutá, řapíky dlouhé 2 - 5cm, celková délka je 5 - 10cm a šířka 4 - 6cm. Kvete zelenobílými květy v 5 - 10cm vzpřímených hroznech složených ze 6 - 10ti květů. Nažky jsou dlouhé 2,5 - 3cm, křídla svírají pravý úhel a jsou dovnitř zkroucená. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *rubripes*/subsp. *koreanum*/*A. komarovii* - Čína, Korea, Mandžusko; malý storm nebo stromovitý keř; větve tmavězelené až šedé, bíle pruhované, borka mladých větví červená, později žlutozelená; listy 5laločné, dlouhé 5 - 18cm, široké 4 - 6cm, laloky protaženější, řapíky červené, dlouhé do 7cm, podzimní barva je žlutá až oranžová; květenství je hroznovité, květy mají stopky délky 0,7 - 1cm, kališních lístků je 5, mají vejčité podlouhlý tvar, 5 okvětních lístků, tyčinek 8, semeníky načervenalé; nažky dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1 - 1,2cm, pouzdra semen dlouhá 8mm a široká 5mm

<https://www.rostliny.net/>