

Ophrys bertolonii (Tořič Bertolonový)

synonyma: *Arachnites bertolonii*, *Arachnites insengae*, *O. f. parviflora*, *O. f. triloba*, *O. subsp. dalmatica*, *O. subsp. insengae*, *O. subsp. landaueri*, *O. var. dalmatica*, *O. var. landaueri*, *O. var. parviflora*, *O. var. triloba*, *Ophrys dalmatica*, *Ophrys flavicans*, *Ophrys grassensis*, *Ophrys insectifera subsp. bertolonii*, *Ophrys inzengae*, *Ophrys marzensis*, *Ophrys penedensis*, *Ophrys romolinii*, *Ophrys speculum*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Itálie, Katalánsko, Kosovo, Makedonie, Řecko, Sicílie, Slovinsko, Srbsko

Pochází ze středního střeozemí. Kvete bílofialovými květy s tmavěfialovým pyskem. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. aurelia
- subsp. balearica
- subsp. benacensis
- subsp. bertolonii (Tořič Bertolonový pravý)
- subsp. bertoloniiformis
- subsp. catalaunica
- subsp. drumana
- subsp. explanata
- subsp. saratoi

Vyhovují mu světlé křoviny, okraje lesů a vápencový podklad.

<https://www.rostliny.net/>