

Acer tutcheri

synonyma: *Acer bicolor* var. *serratifolium*, *Acer oliverianum* var. *nakaharae* subvar. *trilobatum*, *Acer oliverianum* var. *tutcheri*, *A. subsp. angustilobum*, *A. subsp. formosanum*, *A. var. serratifolium*, *Liquidambar edentata*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: J Čína, JV Čína, Tchaj-wan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Větve jsou holé, růžovofialovohnědé. Mladé větve světlezelené nebo růžovofialovozelené. Borka je růžovofialovohnědá. Listy 3laločné, jemně pilovité, na spodní straně v paždí žilek ochlupená, báze je kulatá až téměř uťatá, řapíky jsou dlouhé 2,5 - 3cm a celková délka je 5 - 10cm. Kvete nažloutlými květy v koncových chocholících, semeníky jsou bíle ochlupené, okvětní lístky obvejčité, kališní lístky žlutozelené, dlouze vejčité. Nažky mají 2,5cm křídla svírající tupý úhel, barvu růžovofialovou a pouzdra semen tloušťky 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *serratifolium* - Čína; listy 3 - 5laločné, pilovité
- var. *shimadai* - Tchaj-wan; malé plody

<https://www.rostliny.net/>