

Acer pectinatum

synonyma: *Acer forrestii* f. *caudatilobum*, *A. f. caudatilobum*, *A. f. rufinerve*, *A. var. caudatilobum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě vysokého opadavého stromu, v kultuře obvykle jen keře. Mladé větve jsou holé, načervenalé až nahnědlé nebo šedé, později nevýrazně bíle pruhované. Listy jsou 3 - 5tilaločné, dlouhé 7 - 14cm, bazální laloky malé, laloky 3úhlé až vejčité, až ocasovité, jemně a ostře 1 - 2x pilovité, na spodní straně v paždí žilek ochlupené, řapíky červené a dlouhé 6 - 8cm. Kvete v červeno zelených hroznech, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 3mm, široké 1mm a okvětní lístky jsou kratší. Plodí v 7 - 10cm hroznech, stopky plodů mají délku 0,4 - 1cm, pouzdra semen jsou dlouhá 7mm, široká 4mm, celková délka je 2,2 - 2,5cm a šířka 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alice'
- subsp. *forrestii*
- subsp. *laxiflorum*
- 'Mozart'

<https://www.rostliny.net/>