

Acer triflorum (Javor tříkvětý)

synonyma: *Acer leiopodum*, *A. f. subcoriacea*, *A. subsp. leiopodum*, *A. var. leiopodum*, *A. var. subcoriacea*, *A. var. subcoriaceum*, *Crula triflora*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Korea, Shaanxi, SV Čína

Roste v Číně a Koreji v podobě opadavého stromu až stromovitého keře s protáhlou vejčitou až válcovitou zaoblenou korunou. Dorůstá výšky až 25m, ale obvykle je nižší. Větve jsou brzy lysé a mají hodně lenticel. Borka má žlutohnědou barvu. Listy jsou zelené, mají 2,5 - 6cm řapík, čepel je 3četná dělená na 4 - 7 (i 9)cm dlouhé a 2 - 3,5cm široké přisedlé lístky vejčitého až podlouhlého, kopinatého nebo obkopinatého tvaru s okraji celokrajnými nebo s několika zuby, spodní strana je modrozelená, podél centrálního žebra ochlupená, řapíky jsou dlouhé 3 - 5cm a řapíčky 0,5 - 1cm. Kvete žlutými květy ve vzpřímeném chocholíku o velikosti 3cm. Plodem je nažka délky 3,5 - 4,5cm, šířky 1,3 - 2cm, pozdra semen jsou ochlupené, téměř kulatá, dlouhá 1,4 - 1,6cm a široká 1 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *leiopodum*/subsp. *leiopodum*/*A. leiopodum* - Shaanxi; mladé větve a řapíky holé; lístky dlouhé 3 - 3,5cm, široké 1,5 - 2cm
- var. *shensiense* - Shaanxi; lístky délky 4 - 6cm, šířka 2 - 2,5cm, řapíky dlouhé 2,5 - 3,5cm; stopky květů dlouhé 1 - 1,5cm
- var. *triflorum*/f. *subcoriaceum* - Čína, Korea; řapíky délky 5 - 7cm, lístky délky 7 - 9cm a šířka 2,5 - 3,3cm; květy mají stopky délky 1,5 - 2cm

<https://www.rostliny.net/>