

Bromus commutatus (Sveřep luční)

synonyma: *Brachypodium commutatum*, *Bromus agrarius*, *Bromus agrarius* subsp. *diffusus*, *Bromus agrarius* var. *diffusus*, *B. f. depauperatus*, *B. subsp. scabratus*, *B. var. apricorum*, *B. var. gyorffyi*, *B. var. lanceolatus*, *B. var. macrostachys*, *B. var. minor*, *B. var. multiflorus*, *B. var. neglectus*, *B. var. pubens*, *B. var. scabratus*, *B. var. villosus*, *B. var. violaceus*, *Bromus gaudinii*, *Bromus hordeaceus* var. *commutatus*, *Bromus hordeaceus* var. *pratensis*, *Bromus japonicus* f. *diffusus*, *Bromus mollis* var. *commutatus*, *Bromus mollis* var. *neglectus*, *Bromus mutabilis* var. *commutatus*, *Bromus mutabilis* var. *pratensis*, *Bromus neglectus*, *Bromus pratensis* var. *apricorum*, *Bromus pratensis* var. *multiflorus*, *Bromus racemosus* subsp. *commutatus*, *Bromus racemosus* var. *commutatus*, *Bromus racemosus* var. *glabriglumis*, *Bromus racemosus* var. *neglectus*, *Bromus racemosus* var. *vilosus*, *Bromus scabratus*, *Bromus secalinus* subsp. *commutatus*, *Bromus secalinus* var. *commutatus*, *Bromus secalinus* var. *gladewitzii*, *Bromus squarrosus* subsp. *commutatus*, *Bromus tzvelevii*, *Forasaccus commutatus*, *Serrafalcus commutatus*, *Serrafalcus neglectus*, *Serrafalcus racemosus* subsp. *commutatus*, *Serrafalcus racemosus* var. *commutatus*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Řecko, Rhode Island, S Afrika, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Asie, Západní Virginie

Vyskytuje se v jižní Evropě, severní Africe a západní Asii. Byl zavlečen i do USA. Dorůstá výšky 0,4 - 0,9 (i 1,2)m. Květenstvím je řídší lata délky 7 - 20cm, šířka je větší, dolní větve dlouhé, po odkvětu převislé, stopky klásků jsou dlouhé do 7cm, pluchy mají délku (0,7 -) 2,9 - 1cm s okrajem v horní 1/3 se zužujícím v tupém úhlu a osina nejspodnějších květů je kratší. Patří mezi ohrožené druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *commutatus*
- subsp. *decipiens*
- subsp. *neglectus*

Vyhovují mu meze, úhory, suché stráně a okraje polí.