

Bromus erectus (Sveřep vzpřímený)

synonyma: *Bromopsis alexeenkoi*, *Bromopsis condensata*, *Bromopsis condensata* subsp. *australis*, *Bromopsis erecta*, *Bromopsis erecta* subsp. *alexeenkoi*, *Bromopsis erecta* subsp. *gordjagini*, *Bromopsis erecta* subsp. *longiflora*, *Bromopsis erecta* subsp. *transsilvanica*, *Bromopsis gordjagini*, *Bromopsis microchaeta*, *Bromopsis permixta*, *Bromopsis syriacus*, *Bromopsis transsilvanica*, *Bromus agrestis*, *Bromus angustifolius*, *Bromus asper*, *Bromus bertolae*, *Bromus caprinus*, *Bromus collinus*, *Bromus condensatus* subsp. *microtrichus*, *Bromus condensatus* var. *australis*, *Bromus condensatus* var. *microtrichus*, *Bromus condensatus* var. *pomoensis*, *Bromus dolichostachys*, *B. f. viviparus*, *B. subsp. australis*, *B. subsp. microchaetus*, *B. subsp. permixtus*, *B. subsp. transsilvanicus*, *B. var. angustifolius*, *B. var. anisophyllus*, *B. var. australis*, *B. var. borbasii*, *B. var. caprinus*, *B. var. cilifer*, *B. var. contractus*, *B. var. depauperatus*, *B. var. dissolutus*, *B. var. fallax*, *B. var. fasciculatus*, *B. var. fibrosus*, *B. var. flaccidus*, *B. var. glaber*, *B. var. glabra*, *B. var. glabratus*, *B. var. glabrescens*, *B. var. glabriflorus*, *B. var. glaucus*, *B. var. hackelii*, *B. var. hercegovianus*, *B. var. hirsutus*, *B. var. lingiaristatus*, *B. var. longiflorus*, *B. var. longispicatus*, *B. var. longispiculatus*, *B. var. macrostachys*, *B. var. microtrichus*, *B. var. planifolius*, *B. var. pomoensis*, *B. var. pseudoverticillatus*, *B. var. puberulus*, *B. var. pubescens*, *B. var. pubiflorus*, *B. var. pycnotricha*, *B. var. pygmaeus*, *B. var. racemiferus*, *B. var. reptans*, *B. var. rohlenae*, *B. var. roxolanicus*, *B. var. stenophyllus*, *B. var. subvillosus*, *B. var. syracus*, *B. var. trachystachys*, *B. var. transsilvanicus*, *B. var. trichanthus*, *B. var. tricolor*, *B. var. velutinus*, *B. var. vernalis*, *B. var. wildtii*, *Bromus glabriflorus*, *Bromus glaucus*, *Bromus heterophyllus*, *Bromus longiflorus*, *Bromus macounii*, *Bromus microchaetus*, *Bromus microtrichus*, *Bromus odoratus*, *Bromus perennis*, *Bromus permixtus*, *Bromus pratensis*, *Bromus pseudoarvensis*, *Bromus pubiflorus*, *Bromus racemiferus*, *Bromus stenophyllus*, *Bromus subrectus*, *Bromus transsilvanicus*, *Bromus transsilvanicus f. cilifer*, *Festuca aspera*, *Festuca drymeja* var. *fagetina*, *Festuca erecta*, *Festuca fagetina*, *Festuca hirta*, *Forasaccus erectus*, *Schedonorus erectus*, *Schedonorus laxus*, *Serrafalcus pratensis*, *Zerna angustifolia*, *Zerna condensata*, *Zerna erecta*, *Zerna erecta* subsp. *alexeenkoi*, *Zerna erecta* subsp. *gordjagini*, *Zerna microchaeta*, *Zerna permixta*, *Zerna transsilvanica*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Andalusie, Arménie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Írán, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Polsko, Quebec, Severní Dakota, SZ Afrika, Švýcarsko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Vyskytuje se v Evropě, jihozápadní Asii, severozápadu Afriky a byl zavlečen i do Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Roste v hustých trsech. Dorůstá výšky až 0,4 - 0,9 (i 1,2)m. Pod zemí nevytváří výběžky. Stonek je dělený 3 - 4mi kolénky. Listy mají délku do 30cm, jsou úzké, někdy částečně svinuté, řídce dlouze brvitě, dolní zpravidla štětinovitě složené a pochvy min. dolních listů jsou hustě ochlupené. Kvete ve stažené latě složené z klásků, může být fialová, červená nebo i zelená, prašníky jsou dlouhé, oranžové a pluchy mají osinu délky 0,4 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *erectus* (Sveřep vzpřímený pravý) - dolní listy úzké, štětinovitě složené, horní ploché, širší; lata tuhá, přímá a úzká s krátkými větvemi, klásky 5 - 7mikvěté, dlouhé 2cm, plevy a pluchy na žilkách nazpět směřujícími osténky drsné, pluchy holé (i krátce přitiskle ochlupené); suché i dočasně vlhké louky, pastviny, křovinaté stráně
- subsp. *longiflorus* (Sveřep vzpřímený dlouhokvětý) - všechny listy ploché a chabé; lata řídká, větve dlouhé do 5cm, slabé, odstálé až převislé, klásky až 11tikvěté, dlouhé do 4cm, pluchy ochlupené; suché stráně
- subsp. *stenophylla*
- subsp. *transsilvanica*

Vyhovují mu výslunné stráně.

<https://www.rostliny.net/>