

Pedicularis sudetica (Všivec krkonošský)

synonyma: *Pedicularis novaiae-zemliae*, *P. subsp. arctoeuropaea*, *P. subsp. novaiae-zemliae*

čeleď: Orobanchaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Kolorado, Manitoba, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Polsko, Quebec, Severozápadní Teritorium, Wyoming, Yukon

Patří mezi endemity Krkonoš. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Pod zemí vytváří krátký oddenec. Stonek je načervenalý a nevětvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, mají kopinatý tvar a jsou peřenosečně dělené. Vlastní úkrojky jsou trojúhelníkové zakončené bílou špičkou. Kvete růžovými nebo růžovofialovými květy v hustém hroznu, listeny se zpravidla listům nepodobají, jsou víceméně celokrajné, hustě ochlupené a kalich je nafouklý. Plodem je vejčitá tobolka, která je 2x delší než vytrvalý kalich. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *albolabiata*
- subsp. *arctoeuropaea*
- subsp. *gymnostachya*
- subsp. *interior*
- subsp. *interiorioides*
- subsp. *novalae-zemliae*
- subsp. *pacifica*
- subsp. *scopulorum*
- subsp. *sudetica* (Všivec krkonošský pravý)

Vyhovují mu terénní propadliny s větší sněhovou pokrývkou, rašeliniště a prameniště.

<https://www.rostliny.net/>