

# Hedera hibernica (Irský břečťan)

synonyma: Hedera canariensis var. maculata, Hedera grandifolia var. maculata, Hedera helix f. maculata, Hedera helix subsp. hibernica, Hedera helix var. hibernica, Hedera helix var. maculata, Hedera vegeta, Hedera vitifolia

čeleď: Araliaceae

oblasti: Andalusie, Francie, Irsko, Jižní Karolína, Katalánsko, Oregon, Portugalsko, Severní Karolína, Velká Británie, Washington

Roste od Irska a Velké Británie po Španělsko a Portugalsko. Dorůstá délky 20m. Kmínky jsou zelené až žlutozelené, později hnědé a přírůstky dlouhé 3 - 7cm. Větve jsou šedě hvězdicovitě ochlupené a chlupy jsou 6 - 8miramenné. Listy jsou dlouhé 5 - 12cm, široké 8 - 16cm, zelené až tmavězelené, občas lesklé, chlupy hvězdicovitě 5tilaločné (staré nelaločnaté a vejčité), laloky 3úhlé, tupě špičaté, centrální lalok větší, laloky mělké, báze srdčitá a žilnatina má bledě zelenou barvu. Květy mají v průměru 0,8 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aracena* - kmínky růžovofialovozelelé, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy vejčité eliptické, tupě špičaté, nelaločnaté (i mělce 3laločné), dlouhé 4 - 6cm, široké 3 - 8cm, matné, tmavězelené, báze klínovitá nebo uťatá a chlupy jsou 5 - 9tipaprsčité
- 'Deltoidea'/H. helix var. *hastata*/H. helix var. *deltoidea*/H. helix 'Deltoidea' - kmínky zelené nebo načervenalé, šedě hvězdicovitě ochlupené, chlupy 4 - 6tipaprsčité, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; listy tlusté, matné, tmavězelené, na podzim růžovofialové, mělce 3laločné až nelaločnaté, dlouhé 4 - 10cm, široké 5 - 10cm, báze srdčitá, bazální laloky se překrývají a řapíky zelené
- 'Hamilton' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy 5tilaločné, dlouhé 6 - 7cm, široké 9 - 10cm, zelené, laloky ocasovité, centrální delší než ostatní, bazální laloky redukované, hluboké, srpovité a žilnatina s řapíky bledězelená
- 'Helford River' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 2 - 3cm; zelené, listy 5tilaločné, dlouhé 6 - 10cm, široké 7 - 11cm, centrální lalok prodloužený, zašpičatělý, postranní klínovité, špičaté, bazální zpětně zahnuté, výkrojky mělké, žilky šedobílé
- 'Lobata Major'/H. helix 'Lobata Major' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 5 - 6cm; listy 3laločné, dlouhé 4 - 8cm, široké 5 - 11cm, u báze pouze výstupky a řapíky jsou zelenorůžovofialové
- 'Maculata'/f. *maculata*/'Hibernica Maculata'/'Maculata'/H. *latimaculata* - kmínky zelené (později hnědé), přírůstky dlouhé 5 - 7cm; listy tmavězelené, jemně béžovobíle pruhované a skvrnité, dlouhé 5 - 9cm, široké 8 - 14cm, 5tilaločné, laloky 3úhlé, mělké, tupě špičaté, centrální větší, báze srdčitá
- 'Rona' - kmínky zelené, přírůstky dlouhé 5 - 6cm; listy mělce 5tilaločné, zelené, pestré, skvrnité, tupě špičaté, centrální lalok větší, báze srdčitá
- 'Rottingdean' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy 5tilaločné, tmavězelené, centrální lalok delší i větší, špičaté, bazální laloky zakrnělé, báze uťatá až srdčitá, žilnatina bledší, nevyniklá
- 'Sarniensis' - listy zelené se světlejší žilnatinou
- 'Sulphurea'/H. helix 'Sulphurea' - kmínky růžovofialovozelelé, přírůstky dlouhé 2,5 - 3cm; listy šedozelené, při okraji tmavěji skvrnité (později našedlé až nažloutlé), 3laločné (i nelaločnaté), dlouhé 4 - 7cm, široké 6 - 8cm, výkrojky úzké, báze uťatá až mírně srdčitá
- 'Triloba' - kmínky růžovofialovozelelé, přírůstky dlouhé 4cm; listy tmavězelené, dlouhé 3 - 6cm, široké 5 - 9cm, 3laločné, laloky klínovité, špičaté (i zaoblené), báze srdčitá, řapíky růžovofialovozelelé
- 'Variegata' - kmínky zelenorůžovofialové, přírůstky dlouhé 5 - 7cm; listy některé listy částečně žluté až zcela žluté, dlouhé 5 - 9cm, široké 8 - 14cm, mělce 5tilaločné, laloky 3úhlé, tupě špičaté, centrální lalok větší, báze srdčitá a řapíky růžovofialovozelelé

<https://www.rostliny.net/>