

Listera ovata (Bradáček vejčitý)

synonyma: *Bifolium ovatum*, *Epipactis ovata*, *Helleborine ovata*, *Neottia ovata*, *Ophrys ovata*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Himálaj, Írán, Irsko, Island, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Německo, Ontario, Pákistán, Polsko, Středozemí, Švýcarsko

Roste v Asii, Severní Americe a Evropě, s výjimkou severní Skandinávie jako pozemní trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 40 (i 70)cm. Vytváří 1 pár velkých široce vejčitých přisedlých listů délky 4 - 13cm. Kvete žlutozelenými pyskatými hluboce 2klanými žlutozelenými květy bez ostruhy v 7 - 20 (i 25)cm dlouhém 14 - 65tičetném hroznu, kališní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm, korunní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm, pysk má délku 0,7 - 1,5cm, na bázi postrádá postranní laloky a na konci je z 1/3 rozeklaný ve 2 tupé laloky. Plodem je tobolka. Patří mezi vzácnější druhy C4 a je zapsán v seznamu CITES.

Vyhovují mu vlhké listnaté i smíšené lesy, křoviny, louky, světliny, atp. Má raději vápnité půdy bohaté na živiny.

Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

<https://www.rostliny.net/>