

## Diphasiastrum zeilleri (Plavuník Zeillerův)

synonyma: *Diphasiastrum x zeilleri*, *Diphasium zeilleri*, *Lycopodium complanatum* subsp. *eucomplanatum*

čeleď: Lycopodiaceae

oblasti: Česká republika, Finsko, Německo, Norsko, Polsko, Severní Amerika, Švédsko

Někdy bývá považován jako hybrid *D. complanatum* x *D. tristachyum*. Cirkumboreální. Pod zemí vytváří až 10cm oddenky. Nad zem vyrůstají vzpřímené svazčité šedozelené větve se zelenými přisedlými listy. Sterilní větve jsou zploštělé, široké 1,8 - 2,5mm, na spodní straně žlutozelené až šedozelené, postranní listy jsou ostře kýlnaté a bývají srpovitě zahnuté. Spodní listy jsou širší, široké jako 1/4 šířky větve. Výtrusnicové klasy vyrůstají ve skupinách 2 - 4ks, jsou dlouhé 1,8 - 3cm a objevují se na 1 - 2x větvených stopkách. Patří mezi ohrožené druhy C2.

Vyhovují mu jehličnaté, nejlépe borové lesy, okraje cest s kyselým substrátem.

<https://www.rostliny.net/>