

Anacamptis morio (Vstavač kukačka)

synonyma: A. f. alba, Helleborine athensis, Herorchis morio, Herorchis picta var. skorpili, Orchis albertii, Orchis athensis, Orchis crenulata, Orchis intermedia, Orchis moria, Orchis morio, Orchis morio f. bilobulata, Orchis morio f. nana, Orchis morio f. robustior, Orchis morio f. sublaxiflora, Orchis morio f. sublobatus, Orchis morio f. subpicta, Orchis morio f. unilobata, Orchis morio f. velutina, Orchis morio subsp. alba, Orchis morio subsp. athensis, Orchis morio var. albiflora, Orchis morio var. athensis, Orchis morio var. carnea, Orchis morio var. elatior, Orchis morio var. flava, Orchis morio var. gigas, Orchis morio var. irregularis, Orchis morio var. parviflora, Orchis morio var. rosea, Orchis morio var. skorpili, Orchis morio var. subpicta, Orchis morio var. valida, Orchis morio var. velutina, Orchis morio var. viridiflora, Orchis officinalis, Orchis skorpili, Serapias athensis

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Pochází z Evropy a západní Asie (po Írán). Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (7 -) 13 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří hlízu. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kopinaté, občas eliptické, dlouhé do 14cm a vytvářejí přízemní růžici. Kvete růžovými až fialovými květy v 5 - 25ti četném hroznovitém klasu s délkou do 13cm, pysk je min. stejně široký jako dlouhý, 1 - 1,5cm, 3laločný, postranní laloky jsou mnohem větší, centrální je drobný až zcela chybějící a světlý, tmavě skvrnitý. Patří mezi chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. champagneuxii
- subsp. morio (Vstavač kukačka pravý)
- subsp. picta

Vyhovují mu vlhké nízké spíše sušší louky a půdy s pH 5,5 - 8,6 a bohaté na živiny.

Fotografie převzata z <<http://www.vkolacek.cz/>> .

<https://www.rostliny.net/>