

Liparis loeselii (Hlízovec Loeselův)

synonyma: Anistylis lutea, Cymbidium loeselii, Leptorchis loeselii, Leptorkis loeselii, Liparis bifolia, Liparis correana, L. f. lutosa, L. f. ovata, L. f. squamigera, L. var. cracoviensis, L. var. lutosa, L. var. ovata, Malaxis correana, Malaxis loeselii, Malaxis longifolia, Mesoptera loeselii, Ophrys latifolia, Ophrys liliifolia, Ophrys loeselii, Ophrys pulchella, Ophrys trigona, Orchis loeselii, Paliris loeselii, Pseudorchis loeselii, Serapias loeselii, Sturmia loeselii

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Kansas, Kentucky, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Tennessee, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v mírném pásu Evropy, Asie, na východě USA a ve východní Kanadě. Patří mezi trvalky a je samosprašný. Dorůstá výšky (6 -) 7 - 18 (i 25)cm. Pod zemí vytváří oddenek. Vytváří 2 vstřícné přízemní nestejně velké lesklé listy žlutozelené barvy, větší má délku 3 - 13cm, šířku 1 - 3cm a zbývající má asi 1/3 velikost. Kvete žlutozelenými květy v počtu 3 - 15ks ve 2 - 7cm dlouhém květenství, vnější korunní lístky jsou čárkovité, dlouhé 0,7 - 1cm, vnitřní jsou menší, pysk může mít různá postavení (dolů, do strany, šikmo vzhůru), má délku 5 - 7mm a je mělce podélně žlábkovitý. Plodem je tobolka. Patří mezi ohrožené druhy C1 a je zapsaný i v CITES.

Vyhovují mu bažiny, rašeliniště, atp.

Fotografie převzata z http://www.vkolacek.cz/ .

<https://www.rostliny.net/>