

# Mahonia aquifolium (Mahónie cesmínolistá)

synonyma: Berberis aquifolium, Berberis piperiana, Mahonia piperiana, Odostemon aquifolium

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Česká republika, Dánsko, Francie, Georgia, Idaho, Itálie, Kalifornie, Kentucky, Michigan, Montana, Německo, New Jersey, New York, Norsko, Ohio, Ontario, Oregon, Quebec, Sicílie, Švédsko, Ukrajina, Washington, Z Rusko

Roste v Severní Americe v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,6 - 1,5 (i 5)m a větší šířky. Větve jsou v mládí šedě žluté. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, lichozpeřené, tvořené z 5 - 9ti lístků, dlouhé 20cm, vlastní lístky jsou eliptické až kopinaté, tmavě zelené, tuhé, kožovité, lesklé, vykrajované, na okrajích ostře špičaté, dlouhé 4 - 8 (i 12)cm a na podzim červené až růžově fialové. Květenstvím je hustý vzpřímený 30 - 60tikvětý hrozen délky až 35cm, vlastní květy jsou žluté (i načervenalé) a korunními lístky jsou dlouhé 4mm. Plodem je tmavě modrá ojíněná bobule průměru 8mm obsahující hnědá lesklá asymetricky hranatá semena. Je jedovatá (plody v malém množství jsou jedlé, měly by projít tepelným zpracováním.) Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Compacta' - kompaktní habitus; 1/2 výška
- 'Green Ripple'
- 'Orange Flame' - listy žlutě zelené, později oranžové, na podzim růžově fialově hnědé

Není náročná. Vyhovuje jí dobře propustná vlhčí půda bohatá na živiny (kyselá i zásaditá), plné slunce, polostín nebo stín.

<https://www.rostliny.net/>