

Claytonia perfoliata (Batolka prorostlá)

synonyma: Claytonia cubensis, C. var. amplexans, C. var. angustifolia, C. var. carnososa, C. var. viciae, Limnia angustifolia, Limnia carnososa, Limnia mexicana, Limnia perfoliata, Limnia spathulata, Montia mexicana, Montia perfoliata, Montia perfoliata f. angustifolia, Montia spathulata

čeleď: Montiaceae

oblasti: Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Georgia, Guatemala, Idaho, Irsko, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Mexiko, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Z Evropa

Pochází ze západu Severní Ameriky od Aljašky a Britské Kolumbie po střední USA a Kalifornii. Zplaněla v západní Evropě. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky až 40cm díky květnímu stonku. Vlastní rostlina však může být vysoká pouze 1cm. Listy vytvářejí přizemní růžici. Mají délku 0,5 - 4cm, ale řapík dorůstá délky až 20cm. Listeny jsou na stonko srostlé v límeček. Kvete bílými nebo růžovými květy s 2 - 3 (i 6)mm okvětními lístky. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. intermontana - vnitrozemí západu USA
- subsp. mexicana - pobřeží jižní Kalifornie a Arizony a Mexika s Guatemalou
- subsp. perfoliata (Batolka prorostlá pravá) - tichomořské pobřeží USA a jihozápadní Kanady
- subsp. utahensis - Utah

<https://www.rostliny.net/>