

Krascheninnikovia ceratoides (Bělostník růžkatý)

synonyma: *Achyranthes papposa*, *Axyris ceratoides*, *Ceratoides arborescens*, *Ceratoides compacta*, *Ceratoides compacta* var. *longipilosa*, *Ceratoides eversmanniana*, *Ceratoides latens*, *Diotis ceratoides*, *Eurotia ceratoides*

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Afganistán, Andalusie, Česká republika, Egypt, Írán, J Evropa, J Sibiř, Kazachstán, Maroko, Mongolsko, Pákistán, Rakousko, Rumunsko, S Afrika, S Čína, Slovensko, Středozemí, Ukrajina, Uzbekistán

Roste ve Středomoří, východní Evropě, jihozápadní Asii, jižní Sibiři a v poušti Gobi v podobě keře, polokeře nebo jen dřevnatějící byliny. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,5)m. Povrch je hvězdovitě ochlupený. Lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé. Listy jsou kopinaté, vejčité nebo čárkovité, špičaté, mírně podvinuté, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,25 - 1cm, žilnatinu tvoří 1 žilka a řapíky jsou velmi krátké. Samčí květy vytvářejí stopkaté klubíčka, samičí jsou tvořené také klubíčky, ale v nižších částech rostliny. Plodem je obvejčitá 4úhlá 2rohá nažka délky 3mm s kožovitým oplodím. Semena mají 4 svazky dlouhých chlupů. Patří u nás mezi nejasné případy A3.

Vyhovují mu pusté oblasti, pouště, polopouště, atp.

<https://www.rostliny.net/>