

## Euclidium syriacum (Rukevníček syrský)

synonyma: *Anastatica syriaca*, *Myagrum syriacum*, *Soria syriaca*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afganistán, Austrálie, Himálaj, Idaho, Írán, J Evropa, J Rusko, JV Evropa, Kalifornie, Kazachstán, Kolorado, Massachusetts, Montana, Nevada, Oregon, Pákistán, Sýrie, Utah, V Středozeří, Washington, Wyoming

Roste ve východním středozeří, jižní, jihovýchodní a střední Evropě s přesahem až do střední Asie jako jednoletka, rozšířila se dále v západní a severní Evropě, USA a Austrálii. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Lodyha je hranatá, bohatě větvená, porostlá 2 - 3ramennými chlupy. Listy jsou dlouze obkopynaté, řídce vykrajované až zubaté, dlouhé (1,5 -) 3 - 8 (i 15)cm, široké (0,5 -) 1 - 1,5 (i 3)cm a horní jsou téměř přisedlé až přisedlé. Květenstvím je 15 - 30tikvětý klas nebo hrozen, vlastní květy jsou bílé, mají max. 1mm stopku, průměr 1,5mm, kališní lístky jsou dlouhé 0,8mm a korunní 1,5mm. Plody jsou tvrdé, vejčitého tvaru se zobánkem, celkové délky 4 - 5mm, průměru 2,5mm a obsahují 2 tmavěhnědá vejčitá semena délky 1,5mm. U nás patří mezi nezávěstné druhy A2, dříve se vyskytoval na jižní Moravě.

Vyhovují mu okraje polí a cest, rumišťe, atp. s místy s nízkou konkurencí ostatních rostlin.

<https://www.rostliny.net/>