

Cyperus glaber (Šáchor lysý)

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Írán, Itálie, Izrael, Kavkaz, Kazachstán, Libanon, Pákistán, Sýrie, Tádžikistán, Turecko

Roste od Itálie po Kavkaz, Kazachstán, Tádžikistán, v Turecku, Sýrii, Libanonu, Izraeli a Pákistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky (25 -) 30 - 50 (i 80)cm. Stonky jsou 3hranné a průměru 1,5 - 2mm. Listy jsou přizemní až téměř přizemní, žlutozelené, špičaté, dlouhé do 45cm, široké 3 - 6mm, pochvy jsou žlutohnědé, zpravidla načervenalé, horní část šedožlutá a dlouhé do 10cm. Květenství má primární větve dlouhé do 3cm, spodních 3 - 5 listenů jsou listovité, dlouhé do 30cm, klásků bývá 50, jsou zploštělé, 8 - 14tikvěté, dlouhé 7 - 9mm a široké 2,5 - 3mm. Plody jsou obvejčité, 3úhlé, hnědočerné až šedočerné a velikosti 1,3mm.

Dokáže růst v kyselém i zásaditém substrátu a nevadí mu ani běžná půda bez vyššího obsahu vody. Je mrazuvzdorný do -12°C.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>