

Erucastrum (Ředkevník)

čeleď: Brassicaceae

Existuje asi 18 druhů.

Erucastrum arabicum

Erucastrum brevirostre

Erucastrum canariense

oblasti: Makaronésie

Pochází z Kanárských ostrovů. Může se jednat o jednoletku i dvouletku. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy mají zelenou barvu a jsou plstnaté. Spodní jsou dlouze vejčité, zpeřeně laločnaté, lodyžní jsou pak poloobjímavé a drsně chlupaté. Květ tvoří 8 - 9 okvětních lístků. Plodem je šešule.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, teplo a vlhko.

Erucastrum cardaminoides

Erucastrum elatum

Erucastrum gallicum (Ředkevník galský)

synonyma: Brassica erucastrum

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Evropa, Západní Virginie

Pochází ze západní Evropy, ale rozšířil se i do Asie a Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy neobjímají lodyhu. Kvete světležlutými květy s listeny. Plodem je šešule obvyklé délky 3 - 4cm.

Vyskytuje se při okrajích cest, rumišťích, atp.

Erucastrum ifniense

Erucastrum leucanthum

Erucastrum littoreum

Erucastrum nasturtiifolium (Ředkevník potočnicolistý)

synonyma: *Sinapis nasturtiifolium*

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Pochází z jihozápadní Evropy. Patří mezi dvouletky až trvalky. Dorůstá výšky 0,2 - 1,1m. V přízemí úkrojky listů objímají lodyhu. Jsou lyrovitě peřenodílné až peřenosečné. Kvete žlutými květy bez listenů. Plodem je šešule obvyklé délky 2,2 - 2,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *benacense* - endemit Itálie
- subsp. *nasturtiifolium*

Vyskytuje se v trávnicích, rumíštích, okrajích komunikací, atp.

Erucastrum palustre

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Erucastrum rifanum

Erucastrum rostratum

oblasti: Jemen

Roste pouze v Jemenu.

Erucastrum thellungii

Erucastrum varium

Erucastrum virgatum

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 0,6 - 1,1m. Přízemní listy jsou dlouhé 4,5 - 25cm, široké 1 - 5 (i 10)cm a jsou rozdělené na 3 - 7 párů segmentů. Květy mají kališní lístky délky 3,5 - 4mm a korunní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Plodem je šešule délky 1,5 - 3,5 (i 4)cm, šířky 0,5 - 1mm a obsahuje max. 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baeticum - sešule dlouhé do 2,5cm
- subsp. brachycarpum - sešule dlouhé 1,5 - 2 (i 2,5)cm
- subsp. pseudosinapis - sešule dlouhé 1,5 - 3,5 (i 4)cm
- subsp. virgatum - endemit Itálie

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/redkevnik-kanarsky>

<http://rostliny.nikde.cz/rostliny-evropy/313/erucastrum-nasturtiifolium-poiret-oeschulz-redkevnik-potocnicolisty>

<https://www.rostliny.net/>