

Rapistrum rugosum (Řepovník svraskalý)

synonyma: *Myagrum rugosum*, *R. subsp. orientale*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Egypt, Francie, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Massachusetts, Missouri, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Střední Asie, Sýrie, SZ Rusko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Wisconsin, Z Rusko

Pochází z oblasti od středozeří po střední Asii. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,2 - 1 (i 1,5)m. Spodní část stonku je porostlá chlupy délky do 1mm. Spodní listy jsou lyrovitě peřenolaločné až peřenoklané, dlouhé 3 - 30cm a široké 0,8 - 13cm. Kvete světležlutými květy s kališními lístky délky 3 - 4 (i 5)mm a korunními lístky délky (0,6 -) 0,7 - 10 (i 1,1)cm. Plodem je šešule délky 0,6 - 1cm, je zakončený 2 - 5mm čnělkou a obsahuje 1 semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *linnaeanum*
- subsp. *orientale* (Řepovník svraskalý východní)
- subsp. *rugosum* (Řepovník svraskalý pravý)

<https://www.rostliny.net/>