

Sempervivum ciliosum

synonyma: *Sempervivum borisii*, *Sempervivum borisii* var. *ciliosum*, *Sempervivum ciliatum*, *S. f. borisii*, *S. subsp. borisii*, *S. var. borisii*, *S. var. borisii* f. *borisii*, *S. var. borisii* f. *ciliosum*, *Sempervivum leucanthum* var. *ciliosum*, *Sempervivum wulfenii*, *Sempervivum wulfenii* var. *skorpilii*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Albánie, Bulharsko, Jugoslávie, Makedonie, Řecko

Roste v Albánii, Bulharsku, Řecku a jižní Makedonii. Lodyha dorůstá výšky 4 - 10cm a je žláznatě ochlupená. Výběžky jsou dlouhé do 13cm, ale dceřiné růžice jsou přisedlé k mateční. Vytváří uzavřené nebo polouzavřené ochlupené šedozelené listové růžice o průměru 2 - 3,5 (i 5)cm. Vlastní listy jsou obkopynaté, zašpičatělé, zpětně ohnuté, zakončené šedými žláznatými chloupky délky 2 - 4mm. Lodyžní lístky jsou dlouhé 3cm a široké 6 - 7mm. Kvete v 4 - 5cm květenství ze žlutozelených květů. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ciliosum*
- subsp. *octopodes*

Vyhovují mu suchá kamenitá nebo skalnatá místa.

<https://www.rostliny.net/>