

Acer caudatifolium

synonyma: *Acer capillipes* subsp. *insulare*, *Acer insulare*, *Acer kawakamii*, *Acer kawakamii* var. *taitonmontanum*, *Acer morrisonense*, *Acer ovatifolium*, *Acer pectinatum* subsp. *formosanum*, *Acer taiton-montanum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě opadavého řídkěji nebo hustěji větveného stromu. Dorůstá výšky 10 - 12 (i 20)m. Mladé větve jsou holé. Borka je bíle pruhovaná na červenozeleném podkladu. Listy jsou tenké, vejčité podlouhlé nebo vejčité, dlouhé 6 - 10 (i 15)cm, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek, okraj je 2x pilovitý, konec ocasovitý, báze je zaoblená, uťatá až mělce srdčitá, spodní strana je holá, v mládí ochlupená, řapík je zelený nebo červený, má délku 3 - 7cm, tvar je na mladých větvích laločnatý, na starší téměř bez laloků a podzimní barva je žlutá. Květenství je hroznatě okolíčnaté. Květy mají 6 - 7mm stopky, 5 kališích růzovofialových lístků, okvětních lístků je 5, tyčinek 8, semeníky jsou růzovofialové, holé. Plody jsou žlutohnědé, pouzdra semen mají průměr 5mm a křídla jsou dlouhá 1,8 - 2,2cm a šířka 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Vairegatum' - bíle kropenaté listy, v mládí růžové

<https://www.rostliny.net/>