

Acer laurinum

synonyma: *Acer cassiifolium*, *Acer chionophyllum*, *Acer curranii*, *Acer decandrum*, *Acer javanicum*, *A. subsp. decandrum*, *A. var. petelotii*, *Acer macropterum*, *Acer niveum*, *Acer niveum f. cassiifolium*, *Acer niveum f. laurinum*, *Acer niveum var. cassiifolium*, *Acer philippinum*, *Acer pinnatinervium*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Čína, Filipíny, Jáva, Malajsie, Sumatra

Roste v Číně, Malajsii, Jávě, Sumatře a Filipínách v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 25 - 48m, přičemž samotný kmen má výšku až 28m a průměr 70cm. Na začátku suššího období listy raší po 2 - 4ks najednou z ložských pupenů dlouhých 4mm. Větve jsou šedozelené až růžovofialové. Listy jsou eliptické až kopinaté, na konci až ocasovité, spodní strana je šedozelená, horní lesklá, zelená, okraj celokrajný nebo slabě pilovitý, řapíky bývají rýhované, dlouhé 2 - 6cm, celková délka je 9 - 15cm a šířka 3 - 8cm. Květenstvím je postranních holý chocholík délky 2,5 - 10cm s 0,5 - 3,5cm stopkami složený buď ze samičích nebo samčích (vzácně s několika květy opačného pohlaví). Květy mají 0,4 - 1,7cm stopky, barvu světležlutou, kališních lístků i okvětních lístků je 3 - 5ks, tyčinek je 4 - 12ks, semeníky jsou široké 2mm. Nažky jsou dlouhé 3 - 7cm, bývají růžovofialové, křídla jsou asymetrická, obvejčitá a svírají ostrý až tupý úhel.

<https://www.rostliny.net/>