

Acer mono (Javor mono)

synonyma: Acer cappadocicum subsp. mayrii, Acer cappadocicum subsp. mono, Acer dippelii, Acer hayatae var. glabra, Acer hayatae var. glabrum, Acer laetum var. parviflorum, Acer latilobum, Acer lobelii var. mono, Acer marmoratum var. connivens, Acer mayrii, A. f. ambiguum, A. f. piliferum, A. f. puberulum, A. f. pulvigerum, A. f. savatieri, A. subsp. ambiguum, A. subsp. glabrum, A. subsp. glaucum, A. subsp. incurvatum, A. subsp. marmoratum, A. subsp. mayrii, A. subsp. okamotoanum, A. subsp. savatieri, A. subsp. taishakuense, A. subsp. trichobasis, A. var. glabrum, A. var. glaucum, A. var. horizontale, A. var. incurvatum, A. var. macropterum, A. var. magnificum, A. var. marmoratum, A. var. mayrii, A. var. minshanicum, A. var. pubigerum, A. var. taishakuense, A. var. tashiroi, A. var. trichobasis, A. var. trunculatum, Acer okamotoanum, Acer pictum f. albomaculatum, Acer pictum f. ambiguum, Acer pictum f. connivens, Acer pictum f. dissectum, Acer pictum f. magnificum, Acer pictum f. mono, Acer pictum f. piliferum, Acer pictum f. puberulum, Acer pictum subsp. dissectum, Acer pictum subsp. glaucum, Acer pictum subsp. incurvatum, Acer pictum subsp. macropterum, Acer pictum subsp. mayrii, Acer pictum subsp. minshanicum, Acer pictum subsp. mono, Acer pictum subsp. okamotoanum, Acer pictum subsp. pubigerum, Acer pictum subsp. savatieri, Acer pictum subsp. taishakuense, Acer pictum var. ambiguum, Acer pictum var. angustilobum, Acer pictum var. connivens, Acer pictum var. dissectum, Acer pictum var. glaucum, Acer pictum var. marmoratum, Acer pictum var. mayrii, Acer pictum var. mono, Acer pictum var. parviflorum, Acer pictum var. paxii, Acer pictum var. pubigerum, Acer pictum var. savatieri, Acer truncatum subsp. mono, Kalopanax pictus

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Japonsko, Korea, Mongolsko, Střední Čína, V Rusko, V Sibiř, Zhejiang

Roste v Japonsku, Koreji, Číně, Mongolsku a dále východě. Habitus je pyramidální. Dorůstá výšky 15 - 20m při průměru kmene 0,6 - 1m. Mladé větve jsou holé, zelené nebo nažloutlé, ve 2 letech nažloutlé. Listy mají (3-) 5 - 7 (i 9) laloků, tvar je srdčitý, uťatý nebo zaoblený, barva zelená, laloky jsou vejčité trojúhlé, jemně špičaté, celokrajné, spodní strana je v paždí žilek ochlupená, řapíky při poranění roní mléko, mají délku 4 - 6cm a celková šířka je 8 - 15cm. Kvete žlutozelenými nebo světležlutými květy v 4 - 6cm vzpřímených chocholičnatých hroznech s 15 - 30ti květy. Kališní lístky jsou podlouhlé, dlouhé 2 - 8mm a okvětní lístky jsou eliptické. Nažky jsou mírně vzpřímené, křídla jsou dlouhá 2 - 3cm a svírají ostrý až pravý úhel. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- f. ambiguum/A. ambiguum/A. dippelii/A. pictum var. ambiguum/A. pictum var. paxii - Japonsko; strom nebo keř; výška do 20m; mladé větve s nápadnými šedými lenticelami; listy velikosti 9 - 14cm, 5tilaločné, laloky široké, spodní strana bleděšedá, centrální lalok delší, okraj celokrajný; květy zelenožluté seskupené do krátkých chocholíků; plody žlutohnědé
- 'Dissectum'/A. palmatum 'Asahi Kaede'/A. pictum 'Enko Kaede' - keřovitý stromek; výška 4 - 12m; listy zelené 5 - 7milaločné, okraj zvlněný až mírně zastříhaný do hloubky 60 - 90% čepele, barva tmavězelená, lesklá, celková velikost 7 - 8cm, podzimní barva žlutá
- 'Futagoyama' - listy malé, 5tilaločné, laloky různého tvaru se zúženou bází
- 'Hana No Arashi' - částečně bílé listy
- 'Hoshiyadori'/'Hoshi Yadori'/A. palmatum 'Hoshiyadori' - menší strom nebo keř; výška 5 - 7m; větší (3-) 5 (i 7)milaločné listy, celková délka 8 - 10cm, centrální lalok s postranními jsou téměř 3úhlé, bazální laloky menší nebo zcela chybějí, povrch nepravidelně bíle, béžově a bleděžlutě kropenatý a tečkovaný
- 'Hoshizukiyo'/'Hoshi Zukyo' - větší listy velmi podobné 'Hoshiyadori', pestrost intenzivnější, více pokryvná
- subsp. incurvatum/var. incurvatum - Zhejiang; listy 3 - 5tilaločné, dlouhé 8 - 10cm, široké 8 - 14cm; křídla svírají téměř přímý úhel
- var. latilobum - Japonsko; listy velikosti 4 - 5cm, 5tilaločné, laloky 3úhlé, náhle špičaté, báze uťatá

- 'Marmoratum' - stromovitý keř; výška do 8m; listy řídčeji bíle tečkované nebo pouze zelené
- subsp. mono/A. lobelii subsp. pictum/A. pictum/A. pictum var. eupictum/A. pictum var. mono/A. pictum var. parviflorum/A. pictum var. typicum subvar. eupictum/A. pictum var. typicum subvar. mono/A. truncatum subsp. mono - Čína, Korea, Mongolsko, Rusko - stromy výšky až 20m; mladé větve řídce ochlupené, hnědé, později hnědošedé; listy tenké, na horní strana tmavězelené, lesklé, na spodní straně žlutozelené, holé kromě paždí žilek, 5 - 9tilaločné, laloky celokrajné, široce 3úhlé, bazální laloky mohou být zakrnělé, báze hrálovitá, celková délka 5 - 12cm, šířka 6 - 10cm; květenstvím je holá lata; květy žlutozelené, kališní lístky dlouze vejčité a tupé, okvětní lístky dlouze oválné, tyčinek 8, semeníky ochlupené nebo holé; křídla nažek dlky 2 - 4cm, holá, špičatá nebo tupá
- 'Naguri Nishiki' - listy kropenaté, nejvíce bíle, méně nažloutle nebo béžově
- 'Nikkoense' - zastríhané laloky, spodní strana ochlupená na žilnatině
- 'Satsuki Beni' - mělčejí laločnaté listy, variabilní v barvě - bílopestré, tečkované, skvrnité
- var. savatieri - Japonsko; 7 širších méně vykrajovaných laloků; báze hluboce srdčitá, laloky široce 3úhlé, náhle zašpičatělé
- 'Septemlobus'
- 'Tokiwa Nishiki' - keř nebo strom; výška do 6 - 7m; listy 5 - 7milaločné, centrální lalok téměř 3úhlý, listy jsou velké 7 - 10cm, nápadně pestré, ne kropenaté, občas celá čepel nebo její půlka běžová nebo bílá
- var. tricuspidis/f. tricuspidis/subsp. tricuspidis/A. cappadocicum subsp. trilobum/A. cappadocicum var. tricaudatum/A. bodinieri/A. pictum f. tricuspidis/A. tenellum - střední Čína; výška 7 - 15m; mladé větve růžovofialové, později hnědozelené; borka šedohnědá; listy lesklé, tmavězelené, celokrajné 3 (i 5)tilaločné, dlouhé (4-) 7 - 10 (i 15)cm a široké (5-) 7 - 10 (i 12)cm, postranní laloky krátké, menší listy občas vejčité bez laloků; křídla nažek mají délku 1,6 - 3cm a šířku 1 - 1,2cm
- 'Usugumo'/'Usu Gumo'/'Usugumori' - Japonsko; vzpřímený hustý kompaktní keř; výška 2 - 4m; listy 7 - 9tilaločné, růžové až bělavé, velké 8 - 11cm, nápadně jemně bíle tečkované, bíle proužky po obou stranách listů u žilek rozpitě, laloky krátké, 3úhlé nebo dlouze špičaté; pomalý růst
- 'Variegatum' - listy bílé a béžově pestré

<https://www.rostliny.net/>