

Acer paxii

synonyma: *Acer amoenum*, *Acer hilaense*, *Acer kwangnanense*, *Acer kwangsiense*, *Acer oblongum* var. *biauratum*, *Acer oblongum* var. *erythrocarpum*, *Acer paihengii*, *A. var. semilunatum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky až 15m. Kmínky jsou šedé, hladé. Listy jsou vejčité až podlouhlé či obvejčité, na konci bývají 3laločné, celková délka je 5 - 11cm, šířka 2 - 6cm, laloky jsou krátce špičaté, horní strana bledězelená, lesklá, spodní modrozelená, tuhá, kožovitá, řapík je dlouhý 2 - 5cm. Květenství je bohaté, široké 3 - 4cm, kališních i okvětních lístků je 5, jsou bílé. Nažky jsou žlutozelené, poudzra semen kulovitá, dlouhá 8mm a široká 6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *paxii*/*A. oblongum* var. *biauratum*/*A. oblongum* var. *erythrocarpum* - Sichuan, Yunnan; listy dlouhé 7 - 11cm, široké 4 - 6cm; nažky délky 3cm

<https://www.rostliny.net/>