

Acer rubescens

synonyma: Acer morrisonense

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Tchaj-wan

Pochází z Tchaj-wanu. Roste v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky až 20m. Borka i větve jsou bíle pruhované. Listy jsou téměř stálezelené, opadají až v prosinci, jsou 3 - 5laločné nebo i bez laloků, tvar je variabilní, na konci jsou zúžené, na bujných větvích holé, na menších a starších větvích jsou menší a méně laločnaté, mírně ochlupená, podzimní barva je žlutá, celková délka je 6 - 15cm a šířka 5 - 7cm. Kvete žlutozelenými květy v krátkých hroznech. Nažky jsou seskupené také do krátkých hroznů, mají délku 1,8 - 2,3cm, šířku 6 - 7mm, pouzdra mají délku 6mm a šířku 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Kofuji Nishiki' - listy jsou hustě bíle kropenaté
- 'Kongo Nishiki' - listy jsou žlutě kropenaté a skvrnitě
- 'Millicent' - listy jsou nápadně bíle a šedozeleň skvrnitě a kropenaté
- 'Summer Snow' - keře nebo i nízké stromy s otevřeným habitem; výška 3 - 4m; borka je obvykle méně nápadněji zeleně pruhovaná; listy jsou 3laločné, mírně zkroucené, nápadně bíle- a růžověpestré, široké 5 - 8cm
- 'Summer Surprise' - keře nebo malé široce rozkladité stromy; výška 4 - 5m; větve občas ne příliš nápadně zeleně pruhované; listy měly 3laločné, mírně zkroucené, zelené, bíle- a růžověpestré, někdy zvrhlé do zelena, v mládí načervenalé, celková šířka 5 - 10cm
- 'Wakisaka Nishiki' - listy v mládí růžové až růžovočervené, později béžově kropenaté
- 'Yakushima Nishiki' - listy v mládí žluté, později žlutě až béžově kropenaté

<https://www.rostliny.net/>