

## Acer sikkimense

synonyma: *Acer cordifolium*, *Acer griffithii*, *Acer hookeri*, *Acer hookeri* f. *majus*, *Acer hookeri* var. *majus*, *Acer hookeri* var. *normale*, *Acer hookeri* var. *orbiculare*, *Acer medogense*, *A. f. rufinerve*, *A. f. serrulatum*, *A. f. subintegrum*, *A. subsp. hookeri*, *A. var. serrulatum*, *A. var. subintegrum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Čína, Myanmar (Barma), S Indie, Sikkim, Střední Asie

Roste v Číně, Indii a Myanmaru v podobě stromu. Dorůstá výšky až 15m. Mladé kmínky a větve jsou červené, slabě bíle pruhované, holé. Listy jsou vejčité až podlouhle eliptické, dlouhé 8 - 18cm, bez laloků, nebo občas jen 3laločné, celokrajné, jemně pilovité, náhle krátce špičaté, zelené, lesklé, téměř kožovité, řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenství je hroznovité, 40 - 50tikvěté. Květy mají 2mm stopky, 5 kališích dlouze vejčitý lístků, 5 okvětních žlutozelených lístků s 8mi tyčinkami, semeníky jsou holé. Nažky tvoří hrozny, ve zralosti nahnědlé, pouzdra semen mají délku 8mm a šířku 5mm, křídlo je srpovité, celková délka je 2,3 - 2,5cm a šířka 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hookeri* - mladé větve červené, holé, pupeny červené; listy široce kopinaté, bez laloků, blanité, pilovité, řapíky dlouhé 2 - 4cm
- subsp. *metcalfii*/*A. davidii* var. *trilobatum*/*A. kiagsiense*/*A. metcalfii* - Čína; výška až 10m; borka hladká; větve holé, nevýrazně pruhované; listy opadavé, čepel dlouhá 8 - 14cm, široká 5 - 11cm, 3laločná, téměř kožovitá, z obou stran holá, horní strana tmavězelená, báze téměř srdčitá nebo zaoblená, střední a postranní laloky 3úhle vejčité, okraj hrubě pilovitý, konec špičatý, žilnatinu tvoří 9 - 11 párů žilek, řapíky dlouhé 2 - 5cm, holé; řapíky nažek mají délku 5mm, jsou sekupené po 4 - 9ti ks, pouzdra semen mají délku 8mm, šířku 6mm, celková délka nažek je 2,2 - 2,5cm a šířka 8mm

<https://www.rostliny.net/>