

Acer sterculiaceum

synonyma: *A. var. tomentosum*, *Acer villosum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan, Z Himálaj

Roste v západním Himálaje v podobě stromu o výšce až 20m. Větve jsou nahnědlé, v mládí plstnaté. Listy jsou 3 - 5 (i 7)milaločné, papírovitě tenké, laloky hrubě pilovité, báze (téměř) srdčitá, v mládí jsou obě strany hustě plstnaté, později horní olysává a zůstává tmavězelená, řapíky jsou zelené nebo narůžovofialové, dlouhé 5 - 15cm, celková délka je 10 - 20cm a šířka 11 - 23cm. Kvete v dlouhých převislých hustě plstnatých hroznech. Kališní lístky jsou obkopynaté, dlouhé 3mm, široké 1,5mm, okvětní lístky jsou podobné. Plodí v dlouhých převislých hroznech. Nažky jsou nažloutlé, dlouhé 4 - 6,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *sterculiaceum*/*A. franchetii*. var. *schoenemarkiae*/*A. schoenemarkiae*/*A. schoenemarkiae* var. *oxzcolpum*/*A. villosum* f. *euvillosum*/*A. villosum* f. *sterculiaceum* - Xizang a Yunnan; listy jsou 5 (i 7)milaločné, dlouhé i široké 15 - 20cm; nažky jsou dlouhé 5 - 6cm

<https://www.rostliny.net/>