

Acer tenellum

synonyma: *Acer cappadocicum* var. *rotundilobum*, *Acer mono* f. *septemlobum*, *A.* var. *septemlobum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v podobě malého bohatě větveného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 8m. Mladé větve jsou žlutošedé a tenké. Listy jsou holé, téměř okrouhlé nebo vejčité, celokrajné nebo mírně vykrajované, blanité, na spodní straně světlezelené, horní strana tmavězelená, báze je téměř srdčitá nebo srdčitá, čepel 3 - 7milaločná, centrální lalok tupý, konec špičatý, postranní laloky tupé nebo 3úhle vejčité a řapíky jsou holé, dlouhé 3 - 6cm, celková délka je 4 - 10cm a šířka 3 - 8cm. Kvete v terminálním květenství. Kališních lístků je 5, mají podlouhlý tvar a okvětních lístků je také 5, jsou dlouze obvejčité a žlutozelené. Nažky jsou v mládí růžovofialové, dlouhé 2 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *septemlobum*/*A. mono* f. *septemlobum* - listy 7milaločné, laloky 3úhle vejčité; křídla nažek délky 2,8 - 3cm

- var. *tenellum* - listy 3laločné nebo celistvé, laloky tupé; křídla nažek délky 2 - 2,2cm

<https://www.rostliny.net/>