

# Acer tonkinense

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Guangxi, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Vietnamu a Thajsku v podobě nižšího stromu nebo velkého keře. Dorůstá výšky 8 - 12m. Větvě jsou olivové až zelené nebo růžovofialové, voskovitě ojíňené a holé. Borka je tmavěhnědá. Listy jsou mělce 3laločné nebo 3zubé, kožovité, laloky eliptické nebo 3úhlé, špičaté, celokrajné, báze kulatá až mírně srdčitá, řapíky jsou dlouhé 3cm, celková délka je 10 - 17cm a šířka 7 - 15cm. Kvete v terminálních latách o délce 8 - 10cm. Kališních lístků je 5, mají růžovofialovozelenou barvu, okvětních lístků je také 5 a jsou nažloutlé. Tyčinek je 8. Nažky mají délku 1,8 - 3,5cm, křídla svírají téměř přímý úhel, pouzdra semen mají délku 8mm a šířku 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. kwangsiense/A. kwangsiense - východ Guangxi; listy řídce pilovité, dlouhé 12 - 17cm, široké 12 - 15cm; nažky dlouhé 2,8 - 3cm
- subsp. liquidambarifolium/A. liquidambarifolium - Yunnan, Thajsko; listy celokrajné, téměř okrouhlé, velké 8 - 14cm; nažky délky 1,8 - 2,2cm
- subsp. tonkinense - Čína, severní Vietnam; listy eliptické, dlouhé 10 - 15cm, široké 7 - 11cm; nažky délky 3 - 3,5cm

<https://www.rostliny.net/>