

Acer x zoeschense

synonyma: *Acer aetnense*, *Acer atheniense*, *Acer campestre* var. *aetnense*, *Acer neglectum*, *Acer neglectum* var. *zoeschense*

čeleď: Sapindaceae

Jedná se o hybrid *A. campestre* x *A. cappadocicum* nebo *A. lobelii*. Roste v podobě hustěji větveného stromu. Dorůstá výšky až 15m. Mladé větve jsou mírně korkovité, žlutohnědé a jemně ochlupené. Listy jsou 5 - 7milaločné, laloky špičaté, horní strana lesklá, tmavězelená, může být načervenalá, spodní strana je bledší, v mládí ochlupená, řapíky jsou tmavěčervené, dlouhé 6 - 10cm, celková šířka je 8 - 12 (i 20)cm. Kvete žlutozelenými květy ve vzpřímených chocholících s 10 - 12ti květy, délkou 5cm a šířkou 2cm. Nažky mají křídla délky 3 - 5cm, barvu žlutozelené, narůžovělé a svírají přímý úhel. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Annae'/*A. neglectum* 'Annae' - hustěji větvený; výška 10 - 22m; koruna stejně vysoká i široká; listy při rašení tmavěčerveně, někdy jen na okraji, později lesklé, tmavězelené, na okraji růžovofialovělé, 3 - 5tilaločné, občas zvlněné, velké 5 - 8cm, řapíky při poranění roní
- 'Elongatum' - listy jsou 3laločné, laloky dlouze úzce špičaté, znovu mírně laločnaté, okraj je zvlněný, žilky s řapíkem jsou červené
- 'Friderici'/*A. neglectum* 'Friderici' - listy jsou při rašení žlutobílé, později trvale žluté, řapík i žilky červené

<https://www.rostliny.net/>