

Gagea liotardii

synonyma: Gagea anisanthos, Gagea brentae, Gagea emarginata, Gagea erubescens, Gagea fistulosa var. dyris, Gagea fistulosa var. fragerifera, Gagea intermedia, Gagea lasczinskyi, G. subsp. erubescens, Gagea lutea var. brentae, Gagea minima subsp. intermedia, Gagea mirabilis, Gagea samojedorum, Gagea turcomanica, Ornithogalum erubescens, Ornithogalum fragiferum, Ornithogalum liotardii, Ornithogalum minimum var. fragiferum, Ornithoxanthum liotardii, Stellaster liotardii

čeleď: Liliaceae

oblasti: Afganistán, Afrika, Andalusie, Čína, Indie, Írán, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán, Středozemí, Švýcarsko, Tádžikistán, Ťan-šan, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste od středozemí po střední Asii max. v malých skupinách. Pod zemí vytváří cibuli průměru (0,5 -) 0,7 - 1,2cm s hnědou slupkou. Stonek má výšku (5 -) 8 - 13 (i 15)cm a průměr 2mm. Přízemní list je čárkovitý, mírně přesahuje květenství, má šířku 3 - 4mm, lodyžní listy jsou umístěny 0,5 - 1,5cm pod květenstvím, široce kopinaté a široké 5 - 7mm. Květenství bývá deštníkovité, 3 - 6 (i 8)mikvěté, dlouhé do 5 - 6cm, vlastní květy mají korunní lístky kopinaté, vně zelené, uvnitř žluté, dlouhé 1,4 - 1,8 (i 2)cm a široké 2 - 3mm. Plodem je široce obvejčitá přisedlá tobolka s prohlubní na vrcholu a 3mi paprsky.

<https://www.rostliny.net/>