

## Gossypium barbadense (Bavlník keřovitý)

synonyma: *Gossypium acuminatum*, *Gossypium arboreum* subsp. *perenne*, *Gossypium auritum*, *G. f. casimiranum*, *G. f. darwinii*, *G. f. eggersii*, *G. f. maritimum*, *G. f. suffruticosum*, *G. f. vitifolium*, *G. subsp. darwinii*, *G. subsp. microcarpum*, *G. subsp. peruvianum*, *G. subsp. racemosum*, *G. subsp. sprucei*, *G. subsp. vitifolium*, *G. var. acuminatum*, *G. var. apospermum*, *G. var. brasiliense*, *G. var. caravonicum*, *G. var. cayanense*, *G. var. darwinii*, *G. var. hirsutum*, *G. var. integrum*, *G. var. maritimum*, *G. var. microcarpum*, *G. var. pedatum*, *G. var. peruvianum*, *G. var. rufum*, *G. var. vitifolium*, *Gossypium brasiliense*, *Gossypium brasiliense* var. *apospermum*, *Gossypium calycotum*, *Gossypium cambayense*, *Gossypium frutescens*, *Gossypium frutescens* var. *maritimum*, *Gossypium fruticosum*, *Gossypium fuscum*, *Gossypium glabrum*, *Gossypium guyanense*, *Gossypium guyanense* var. *brasiliense*, *Gossypium herbaceum* var. *vitifolium*, *Gossypium hirsutum* var. *panamicum*, *Gossypium isabelum*, *Gossypium jamaicense* f. *fruticosum*, *Gossypium javanicum*, *Gossypium jumelianum*, *Gossypium lapideum*, *Gossypium lapideum* subsp. *acuminatum*, *Gossypium lapideum* subsp. *brasiliense*, *Gossypium maritimum*, *Gossypium maritimum* var. *polycarpum*, *Gossypium microcarpum*, *Gossypium multiglandulosum*, *Gossypium nankin*, *Gossypium nigrum*, *Gossypium niveum*, *Gossypium pallens*, *Gossypium pedatum*, *Gossypium perenne*, *Gossypium peruvianum*, *Gossypium peruvianum* subsp. *nigrum*, *Gossypium peruvianum* subsp. *racemosum*, *Gossypium peruvianum* subsp. *sprucei*, *Gossypium peruvianum* var. *apospermum*, *Gossypium peruvianum* var. *brasiliense*, *Gossypium peruvianum* var. *braziliense*, *Gossypium peruvianum* var. *glabrum*, *Gossypium peruvianum* var. *nigrum*, *Gossypium peruvianum* var. *racemosum*, *Gossypium peruvianum* var. *sprucei*, *Gossypium pubescens*, *Gossypium quinacre*, *Gossypium racemosum*, *Gossypium religiosum*, *Gossypium rohrianum*, *Gossypium rupestre*, *Gossypium sarmentosum*, *Gossypium speciosum*, *Gossypium suffruticosum*, *Gossypium teleium*, *Gossypium tenax*, *Gossypium trichospermum*, *Gossypium vaupellii*, *Gossypium versicolor*, *Gossypium virens*, *Gossypium virgatum*, *Gossypium vitifolium*, *Hibiscus barbadensis*, *Hibiscus fruticosus*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Havajské ostrovy, Jižní Amerika, Portoriko

Roste ve střední a Jižní Americe v podobě jednoletky až stromovitého keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Povrch je černě tečkovaný a může být i ochlupený. Větve jsou v mládí hranaté a tmavě růžovofialové. Listy jsou dlanité 3 - 7tilaločné, tmavězelené, dlouhé 12 - 20cm, vlastní laloky jsou špičaté a vejčité až obvejčité. Kvete v paždí listů, listeny jsou 3úhlé, tmavězelené, rozečkané na 9 - 11 zubů, kalich pohárkovitý, koruna je žlutá (později růžová) a korunní lístky jsou obvejčité, černě tečkované a dlouhé 3,5 - 5,5cm. Plodem je 3pouzdrá kuželovitá tmavě zelená lesklá tobolka délky (3 -) 4 - 6cm obsahující kromě bavlny i vejčitá semena délky 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminatum*/*G. acuminatum* - listy dlanitě 5tidílné; květy velikosti 6 - 7cm; tobolky dlouhé 5 - 7cm, semena černá
- var. *barbadense*

<https://www.rostliny.net/>