

# Momordica balsamina

synonyma: Momordica involucrata, Momordica schinzii

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Alabama, Arabský poloostrov, Austrálie, Botswana, Florida, Indie, Jihoafrická Republika (JAR), JV Asie, Louisiana, Namibie, Nové Mexiko, Oklahoma, Pákistán, Portoriko, Svazijsko, Texas

Roste v Namibii, Botswaně, Svazijsku, JAR, Indii, Pákistánu, Arábii, tropické Asii a Austrálii jako popínavá nevětvená jednoletka. Dorůstá délky 50cm. Stonek je ochlupený. Listy jsou kulaté, srdčité, 3 - 5tilaločnaté, dlouhé 1,5 - 5 (i 12)cm, laloky široce vejčité, zubaté a řapíky jsou dlouhé 1 - 3 (i 4)cm. Kvete světle žlutými stopkatými květy o průměru 2,5 - 3cm, samčí květy jsou samostatné, mají 1,5 (i 7)cm stopku, samičí květy mají 0,5 - 1,5cm stopku, kalich má ochlupenou trubku délky 5 - 6mm, laloky vejčité, zašpičatělé, široké 3 - 3,5mm, koruna je na bázi hnědá, laloky žluté, obvejčité, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 0,8 - 1 (i 1,2)cm. Plody jsou vejčité, oboustranně zúžené, pouze jemně bradavičnaté, červeně oranžové, dlouhé 2 - 7cm, široké 1 - 2,5cm a obsahují vejčitě eliptická semena délky 1 - 1,2cm a šířky 6 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>