

Momordica charantia (Hořká okurka)

synonyma: *Cucumis argyi*, *Cucumis intermedius*, *Momordica balsamifera*, *M. f. abbreviata*, *M. subsp. abbreviata*, *M. var. abbreviata*, *M. var. longirostrata*, *M. var. muricata*, *Momordica chinensis*, *Momordica elegans*, *Momordica indica*, *Momordica muricata*, *Momordica sinensis*, *Momordica thollonii*, *Sicyos fauriei*

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Alabama, Austrálie, Connecticut, Čína, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Jihoafrická Republika (JAR), Jižní Amerika, JV Asie, Kentucky, Louisiana, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Texas

Roste v jižní a tropické Africe, jihovýchodní Asii až Austrálii jako popínavá jednoletka. Dorůstá délky 4 - 5m. Stonky jsou řídce ochlupené, s 5tubovým průřezem a žebernaté. Listy jsou vstřícné, 5 - 7 (i 9)ti laločnaté, celkově kulaté, špičaté, zubaté, dlouhé 2,5 - 12cm, na bázi srdčité a řapíky dlouhé (1 -) 1,5 - 3,5 (i 7)cm. Kvete žlutými jednopohlavnými květy v paždí listů o průměru 3cm, samčí mají stopku délky 7cm, kalich je ochlupený a koruna má laloky obvejčité. Plody jsou žlutě zelené, žebrovité, bohatě bradavičnaté, dlouhé (3 -) 7 - 30 (i 40)cm, průměru 2 - 5 (i 8)cm a obsahuje kulatá bílá nebo hnědá semena délky 1,3 - 1,6cm s červenou dužinu. Sklízí se v ještě nezralém stavu.

Vyhovují ji tropické i subtropické podmínky, vlhko a horko.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>