

Jacobaea maritima

synonyma: *Cineraria maritima*, *Othonna maritima*, *Senecio cineraria* var. *bicolor*, *Senecio coronopifolius* var. *oasicolus*, *Senecio gibbosus* subsp. *cineraria*, *Senecio maritimus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Irsko, Itálie, Korsika, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Řecko, Sardínie, Severní Amerika, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Tunisko, Velká Británie

Pochází ze středozeší. Byl zavlečen i do Velké Británie a Irska a také do několika částí Severní Ameriky. Patří mezi trvalky a stálezelené polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Povrch je bíle vlnitý. Stonek od báze dřevnatí a je hustě větvený. Zpeřeně vyhlížející listy jsou dlouhé 5 - 15cm, široké 3 - 7cm a tvoří je obkopynaté články také šedobíle plstnaté. Spodní listy jsou hluboce laločnaté, horní již tak hluboké nejsou. Kvete žlutými květy v úbořech o průměru 1,2 - 1,5cm. Kolem středového disku je 10 - 13 kratších okvětních lístků. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bicolor* - endemit Itálie
- 'Cirrus'
- subsp. *gibbosa* - endemit Itálie
- subsp. *maritima*
- 'New Look'
- 'Ramparts'
- subsp. *maritima*
- 'Silverdust'
- 'Silver Filigree'
- 'White Diamond'

Vyhovuje mu plné slunce, méně pak polostín. Odolává teplotám do -12°C až - 15°C. Dokáže růst i v zasolené půdě.

<https://www.rostliny.net/>