

Ipomoea aculeata

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Čína, Filipíny, Jáva, Malé Sundry, Myanmar (Barma), Sumatra, SV Austrálie, Thajsko

Roste v jihovýchodní Asii. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aculeata* - Malé Sundry, Sumatra, Jáva; ovíjivé, dřevnatějící, holé až téměř holé, dlouhé 10 - 15cm, v uzlinách ztlustlé; listy mírně vejčité, celokrajné (i 3laločné), zašpičatělé, dlouhé 5 - 14cm, široké 3 - 10cm, báze srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek, řapíky dlouhé 2,5 - 12cm; kvete v paždí listů samostatnými květy nebo v několika ks, stopky dlouhé do 1,5cm, vlastní květy se otevírají v noci, jsou bílé a nazelenalé, kališní lístky kožovité, stopky až kyjovité, dlouhé do 1,5cm, semeníky holé; plodem je vejčitá tobolka délky 1,5cm obsahující 4 ochlupená semena délky 6 - 8mm
- var. *mollissima*/l. *mollissima*/l. *mollissima* var. *glabrior*/Calonyction *mollissimum*/Calonyction *mollissimum* var. *glabrior*/Calonyction *yomae* - Číny, Indonésie, Myanmar, Filipíny, Thajsko - ovíjivé, dřevnatějící; listy široce vejčité, celokrajné, vzlněné, zašpičatělé, dlouhé 5 - 14cm, široké 3 - 10cm, báze srdčitá a řapíky dlouhé 3 - 10cm; květy jsou bílé a nazelenalé, v průměru mají 8 - 10cm, kališní lístky dlouhé 1,2 - 1,8cm; plodem je vejčitá tobolka délky 1,5cm

<https://www.rostliny.net/>