

Ficus ampelas

synonyma: F. f. bogoriensis, F. f. incrassata, F. var. bandana, F. var. bogoriensis, F. var. laevior, F. var. rugosa, F. var. soronensis, F. var. sublanceolata, Ficus asperior, Ficus bandana, Ficus blepharosepala, Ficus fachikoogi, Ficus fastigiata, Ficus guyeri, Ficus guyeri var. minimifolia, Ficus guyeri var. sibuyanensis, Ficus guyeri var. validicaudata, Ficus hayatae, Ficus irisana, Ficus irisana var. validicaudata, Ficus javensis, Ficus javensis var. subcrenata, Ficus kingiana, Ficus rubricaulis, Ficus rufa, Ficus sibuyanensis, Ficus soronensis, Ficus tashiroi, Ficus tenuicuspidata var. major, Ficus todayensis, Ficus validicaudata

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Indonésie, Japonsko, Tchaj-wan

Roste v Číně, Indonésii, Japonsku a Filipínách v podobě nižšího stromu. Větve jsou světlehnědě až světle červenohnědě ochlupené. Palisty jsou světlehnědé, čárkovitě kopinaté a blanité. Listy jsou tence kožovité, eliptické až kopinaté, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 5cm, celokrajné, hrotitě, báze mírně zkosená, tupá nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Plody jsou samostatné až párovité, umístěné v paždí listů, tvar kulovitý až zploštělý, barva žlutá až červená, žlutě tečkovaná, v průměru mají 5 - 6mm a stopky jsou dlouhé 4 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>