

Ficus ampelas

synonyma: *F. f. bogoriensis*, *F. f. incrassata*, *F. var. bandana*, *F. var. bogoriensis*, *F. var. laevior*, *F. var. rugosa*, *F. var. soronensis*, *F. var. sublanceolata*, *Ficus asperior*, *Ficus bandana*, *Ficus blepharosepala*, *Ficus fachikoogi*, *Ficus fastigiata*, *Ficus guyeri*, *Ficus guyeri var. minimifolia*, *Ficus guyeri var. sibuyanensis*, *Ficus guyeri var. validicaudata*, *Ficus hayatae*, *Ficus irisana*, *Ficus irisana var. validicaudata*, *Ficus javensis*, *Ficus javensis var. subcrenata*, *Ficus kingiana*, *Ficus rubricaulis*, *Ficus rudis*, *Ficus sibuyanensis*, *Ficus soronensis*, *Ficus tashiroi*, *Ficus tenuicuspadata var. major*, *Ficus todayensis*, *Ficus validicaudata*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Indonésie, Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan

Roste v Číně, Indonésii, Japonsku a Filipínách v podobě nižšího stromu. Větve jsou světlehnědě až světle červenohnědě ochlupené. Palisty jsou světlehnědé, čárkovitě kopinaté a blanité. Listy jsou tence kožovité, eliptické až kopinaté, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 5cm, celokrajné, hrotité, báze mírně zkosená, tupá nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Plody jsou samostatné až párovité, umístěné v paždí listů, tvar kulovitý až zploštělý, barva žlutá až červená, žlutě tečkovaná, v průměru mají 5 - 6mm a stopky jsou dlouhé 4 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>