

Ficus annulata

synonyma: *F. var. biverrucella*, *F. var. elliptica*, *F. var. flavescens*, *F. var. valida*, *Ficus balabacensis*, *Ficus flavescens*, *Ficus valida*, *Urostigma annulatum*, *Urostigma biverrucellum*, *Urostigma conocarpum*, *Urostigma flavescens*, *Urostigma validum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Indonésii, Malajsii, Myanmaru, Filipínách, Thajsku a Vietnamu v podobě velkého stromu, ale v mládí se jedná o epifyt. Palisty jsou kopinatě čárkovité, dlouhé 2,5 - 6cm, ochlupené a opadavé. Listy jsou úzce eliptické, špičaté, kožovité, tmavě zelené, dlouhé 13 - 28cm, široké 5 - 8cm, na spodní straně světle zelené, mohou být řídce ochlupené, báze klínovitá (i téměř zaoblená) a řapíky jsou dlouhé 3 - 4cm. Plody jsou párovité, vyrůstají v paždí listů, jsou oranžově červené, vejčité až podlouhlé, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1,5 - 2cm a stopky dlouhé 1 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>