

Ficus benguetensis

synonyma: *F. f. leytenensis*, *F. f. negrosensis*, *F. f. urdanetensis*, *F. var. leytenensis*, *F. var. negrosensis*, *Ficus cuernosensis*, *Ficus cuernosensis var. elongata*, *Ficus fistulosa f. benguetensis*, *Ficus harlandii var. grandifolia*, *Ficus harlandii var. kotoensis*, *Ficus kotoensis*, *Ficus laeviscarpa*, *Ficus maquilingensis*, *Ficus miyagii*, *Ficus ochobiensis*, *Ficus peabodyi*, *Ficus urdanetensis*, *Ficus wenzelii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, J Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu, Okinawě a Filipínách v podobě středně velkého opadavého stromu. Větve jsou v mládí žlutě hnědé až červeně růžově fialové. Palisty jsou vejčitě kopinaté, dlouhé 1,8cm a opadavé. Listy jsou podlouhlé až vejčité, dlouhé 9 - 13cm, široké 4 - 6cm, na spodní straně kolem žilek ochlupená, horní strana holá, báze zaoblená, zkoseně klínovitá nebo srdčitá, konec špičatý a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Plody jsou žluté, téměř kulovité, v průměru mají 1 - 1,5cm a stopky jsou dlouhé 1cm.

<https://www.rostliny.net/>